



South Central District Health

Keeping your family and community healthy
1020 Washington Street N • Twin Falls, ID 83301
(208) 734-5900 Ext. 239

PROFILAXIS PARA LA TULAREMIA

DEPENDIENDO DE SU EDAD, PESO Y CONDICIONES
MEDICAS PREEXISTENTES, SUS ANTIBIÓTICOS PUEDEN
VARIAR DE ÉSOS ENUMERADOS ABAJO.

Adultos:

- Doxycycline: 100mg píldoras dos veces al día por 14 días
○
- Ciprofloxacin: 500mg píldoras dos veces al día por 14 días

Niños:

- Doxycycline píldoras dos veces al día por 14 días (la dosis exacta depende del peso del niño)
○
- Ciprofloxacin píldoras dos veces al día por 14 días (la dosis exacta depende del peso del niño)

Mujeres Embarazadas:

- Doxycycline: 100mg píldoras dos veces al día por 14 días
○
- Ciprofloxacin: 500mg píldoras dos veces al día por 14 días

**USTED DEBE TOMAR TODA LA MEDICACIÓN DURANTE
EL PERÍODO RECOMENDADO.**

**SI USTED EXPERIMENTA ALGUNA SÍNTOMA,
PONGASE EN CONTACTO CON UN PROVEEDOR DEL CUIDADO MÉDICO
INMEDIATAMENTE.**